

Complemento alimenticio

Fórmula de aminoácido

El anhidrato de betaína, o trimetilglicina (TMG), es la forma desacidificada de la betaína y es un importante donante de metilo. El anhidrato de betaína contribuye al metabolismo normal de la homocisteína.

Composición por 2 cucharas medidoras rasas ca. 0,6 gramos (total 1,2 gramos)

Betaina anhidrato (trimetilglicina/TMG) 1,2 g

Es necesaria una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

Contenido Neto

125 gramos de polvo

BONUSAN

TMG/Betaína en polvo

Contribuye al metabolismo normal de la homocisteína



Ingredientes

Betaina anhidrato.

Dosificación

Si no hay consejo diferente, se recomienda mezclar 1-4 veces al día 2 cucharas medidoras rasas con un vaso de agua, remover brevemente y beber. No sobrepasar la dosis diaria recomendada.

Se incluye una cuchara medidora.

Guardar en lugar seco y a temperatura ambiente.

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.



8 207766/01

Producido por: Bonusan BV, Holanda Número de artículo: 207766 **Consumir preferentemente antes de y número de lote:** Ver abajo. Bonusan España SL, C/Juan Ramón Jiménez, 6, E-03730 Jávea, Alicante. www.bonusan.es