

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

Fórmula de vitaminas/minerales

Osteonyl es una fórmula completa con ingredientes que contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, como el ²⁺calcio, el magnesio, el zinc, el manganeso, la vitamina C, la vitamina D y la vitamina K.

COMPOSICIÓN POR 2 TABLETAS RECUBIERTAS

Calcio (como de conchas de ostras y como ascorbato de calcio) 450 mg (56% VRN), magnesio (-carbonato) 100 mg (27% VRN), vit. B1 (tiamina HCl) 3,0 mg (273% VRN), vit. B2 (riboflavina) 3,0 mg (214% VRN), vit. B6 activa (como piridoxal-5-fosfato) 1,4 mg (100% VRN), vit. C (ascorbato de calcio) 40 mg (50% VRN), vit. D3 (como colecalciferol) (600 UI) 15 mcg (300% VRN), vit. E natural (como D-alfa-tocoferil succinato) (18 UI) 15 mg (124% VRN), vit K1 (filoquinino) 40 mcg (53% VRN), vit K2 (como menaquinona-7) 40 mcg (53% VRN), zinc (-citrato) 14 mg (140% VRN), extracto de bambú (mín. 75% sílice) 10 mg, hierro (-fumarato) 7,0 mg (50% VRN), boro (borato de sodio) 1,1 mg, cobre (-lisinato) 0,6 mg (60% VRN), manganeso (-citrato) 0,6 mg (30% VRN), condroitin sulfato 90% 60 mg, L-arginina (L-arginina HCl) 150 mg. VRN = Valor de Referencia de Nutrientes

Es necesaria una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada.

CONTENIDO NETO

60 tabletas recubiertas = 75 gramos

60 TABLETAS

Osteonyl
contribuye al mantenimiento
de los huesos en
condiciones normales¹

BONUSAN

INGREDIENTES

Conchas de ostra, carbonato de magnesio, agente de carga (MCC (gel de celulosa)), L-arginina, agente de carga (HPC (celulosa)), condroitin sulfato, agente de carga (croscarmelosa sódica), ascorbato de calcio, citrato de zinc, antiaglomerante (estearato de magnesio), fumarato de hierro, menaquinona-7, D-alfa-tocoferil succinato, extracto de bambú, agente de recubrimiento (HPMC), borato de sodio, colecalciferol, lisinato de cobre, tiamina, riboflavina, piridoxal-5-fosfato, citrato de manganeso, agente de recubrimiento (aceite MCT), filoquinino.

DOSIFICACIÓN

Si no hay consejo diferente se recomienda tomar 2 tabletas antes de dormir. En el caso de una cura es posible doblar la dosificación durante dos semanas. En caso de empleo prolongado Osteonyl puede ingerirse eventualmente cada dos días. No sobrepasar la dosis diaria recomendada.

No apto para niños menores de 1 año.

Cuando use derivados de cumarina (anticoagulantes), consulte a un médico o farmacéutico antes de usar este producto.

Guardar en lugar seco y a temperatura ambiente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NO CONTIENE

OGM, soja, levadura, gluten, lactosa, gelatina, conservantes, colorantes, aromas y sabores artificiales.

Este producto pertenece a nuestra línea NYL. Formulaciones combinadas que ofrecen una mayor facilidad de uso.



BONUSAN



8 711827 079675

Producido por: Bonusan BV, Holanda/Número de artículo: 7967
Consumir preferentemente antes de y número lote: Ver a bajo/N.R.S.: 26.063355/A
Bonusan España SL, C/ Juan Ramón Jiménez, 6, E-03730 Jávea, Alicante, www.bonusan.com/es

7967B/01