2 FLMMBALETTEN SVIRALTEN Vr. B.1 (als Thiamin HD), 30 mg (273 kR)), the Los Skindavin 3.0 mg (214% RN), Atthes Vr. B.6 (als Pyritorael-5-phosphal), 1.4 mg (124% RN), Atthes Vr. B.6 (als Pyritorael-5-phosphal), 4.8 mg (124% RN), Atthes Vr. B.6 (als Pyritorael-5-phosphal), 4.8 mg (125% RN), Vit. D.3 (als Challescaliderol) (600 lb), 1.5 mg (300% RN), Vit. No. Statistickes, Vit. E. do Jahain-5 compley sisconiant (1816) 1.5 mg (125% RN), Vit. NZ (als Menachinnor 7, XVITAL*9 mg (55% RN)), Calcium (als Calciumascontat und Calciumacantorat aus attantischen Meeresaligen, Aquamin*9 4.5 mg (56% RN), Vit. Statistickes (145% RN), Statistickes (145% RN), Statistickes (145% RN), Statistickes (145% RN), Magnesium (als Magnesiumnalett), 1.0 mg (27% RN), Zmr (als Zinkichtar) 1.4 mg (140% RN), Essen (als Statistickes), cital 37 mg (40% RNP), Mangani els Romanisch and Calciumacantoratisch and Ramanisch and Calciumacantoratisch and Ramanisch and Long (140% RNP), Manganichtar), Gm (20% RNP), der (als Varintmiborar), 1.1 mg Bambus Bambuss anundinaceal Tabaratischer und mr. 75% Silica 10 mg, Chondroitissulfat 90% (find) 60 mg, L-Arginin (als L-Arginin HC)) 150 mg.

NETTOINHALT 60 Filmtabletten = 78 Gramm

60 FII MTABI FTTFN

Osteonyl Expert

Fortschrittliche Formel für die Knochen*

BONUSAN

Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Emährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene abwechslungsreiche Emährung.

ZUMEM Minerallompier aus kalhahtigen Meresalgen (Litebtammium calerami), Magesummatik Agrinn, Füllstoff (Mikrokristalline Callulose), Füllstoff (Hydropyropylcellulose), Dondrodinstaller, Füllstoff (Mikrokristalline Cellulose), Füllstoff (modifizetter Cellulosegumm), Calciumsacorbat, Zinkichta, Eisenbisgyoriat, Freemittel (Magnesiumsate der Spesieffstatum), Menachinor-1, alpha-Toopherylaucinat, Bambus (Bambus arundinacea), Natiumboat, Chelecaliderik, Nuplehsyyoriat, Thaminn, Riboffann, Pyridoxal-5-phosphat, Manganichtat, Überzugsmittel (Hydropyropylimethycellulose, Cherci, Hydropyropylellulose).

(Hydroxypropylmetrylcellulose, Glycenn, Hydroxypropylcellulo VERZEHRSEMPFEHLUNG Wenn nicht anders empfohlen, 2 Tabletten vor dem Schlafengehen einnehmen. Empfohlene Dosierung nicht überschreiten.

Für Kinder unter 1 Jahr nicht geeignet. / Bei der Verwendung von Cumarinderivaten (Antikoagulanzien) konsultiere bitte vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt oder Apotheker.

Trocken und bei Zimmertemperatur aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindem aufbewahren.

Dieses Produkt ist Teil unserer NYL-Linie. Alle unsere NYL-Produkte sind indikationsgerechte Kombinationspräparate für optimalen Anwendungskomfort.



NYL® PRODUCT



3330/01